


التطور التلقائي لمجموعة كيميائية أنشطة وتمارين

تمرين تطبيقي 1

لدينا محلول مائي حجمه 7 يحتوي على ثانى اليود ($I_2(aq)$) وأيونات اليودور ($I^-(aq)$) وأيونات ثيوکبريتات ($S_4O_6^{2-}(aq)$) وأيونات رباعي ثيونات ($S_2O_3^{2-}(aq)$).

يمكن أن تكون هذه المجموعة مقدراً لتفاعل كيميائي معادله هي :



التراكير البديئية للأنواع الكيميائية الموجودة في هذه المجموعة :

$$\left[S_2O_3^{2-} \right]_0 = 0,30 \text{ mol/l} \quad \left[I_2 \right]_0 = 0,20 \text{ mol/l}$$

$$\left[S_4O_6^{2-} \right]_0 = 0,020 \text{ mol/l} \quad \left[I^- \right]_0 = 0,50 \text{ mol/l}$$

1 - أعط تعبير خارج التفاعل المقصود بالمعادلة التفاعل الكيميائي .


2 - أحسب قيمته

2 - في الحالة البديئية

2 - عند اللحظة t حيث $\left[I_2 \right]_t = 0,15 \text{ mol/l}$

تمرين تطبيقي 2: تحديد منحي تطور مجموعة

تفاعل المزدوجتان ($HCOOH(aq)$) / ($HCOO^-(aq)$) و ($CH_3COOH(aq)$) / ($CH_3COO^-(aq)$) في الماء حسب المعادلة الكيميائية التالية :



$$K_{A1}(HCOOH / HCOO^-) = 1,6 \cdot 10^{-4}$$

$$K_{A2}(CH_3COOH / CH_3COO^-) = 1,6 \cdot 10^{-5}$$

قيمة ثابتة التوازن المقصورة بهذا المعادلة الكيميائية عند 25°C هي 10

نمزج في ثلاثة كؤوس A و B و C محلول حمض الإيثانويك ومحلول إيثانوات الصوديوم ومحلول حمض الميثانويك ومحلول ميثانوات الصوديوم لها التركيز نفسه $C = 1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol/l}$ وذلك حسب الحجم المبينة في الجدول التالي :

C	B	A	الأس
1,0	5,0	10,0	$V_1(m\ell)$
1,0	10,0	10,0	$V_2(m\ell)$
10,0	20,0	10,0	$V_3(m\ell)$
1,0	1,0	10,0	$V_4(m\ell)$
3,8	3,7	4,2	pH الخلط عند التوازن
			$\frac{\left[HCOO^- \right]_i}{\left[HCOOH \right]_i}$
			$\frac{\left[CH_3COO^- \right]_i}{\left[CH_3COOH \right]_i}$

			$Q_{r,i}$
			$\frac{[HCOO^-]_{eq}}{[HCOOH]_{eq}}$
			$\frac{[CH_3COO^-]_{eq}}{[CH_3COOH]_{eq}}$
			$Q_{r,eq}$

استثمار :

1 - أحسب في الحالة البدئية قيمتي النسبتين $Q_{r,i}$ و استنتاج قيم i .

نعتبر أن حجم الخليط بالنسبة لكل مجموعة هو : $V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$

2 - عبر ، عند التوازن ، عن النسبتين $\frac{[HCOO^-]_{eq}}{[HCOOH]_{eq}}$ و $\frac{[CH_3COO^-]_{eq}}{[CH_3COOH]_{eq}}$

بدالة $[H_3O^+]$ و K_A . أحسب هاتين النسبتين


3 - استنتاج قيمة خارج التفاعل في الحالة النهائية .

4 - ماذا يمكن أن نستنتج من مقارنة قيمة $Q_{r,i}$ مع ثابتة التوازن K بخصوص تطور المجموعة ؟

تمرين 3

نعتبر مجموعة كيميائية تتكون من الزنك Zn والألومنيوم Al ، وأيونات الزنك Zn^{2+} بتركيز $C = 0,15 mol / \ell$ وأيونات الألومنيوم Al^{3+} بتركيز $C' = 2.10^{-3} mol / \ell$.

يمكن أن يحدث تفاعل أكسدة واحتزال معادلته :



ثابتة التوازن لهذا التفاعل $K = 4.10^{93}$.

1 - أعط تعبير خارج التفاعل الموافق للمعادلة .

2 - كيف ستتطور المجموعة تلقائيا ؟ علل جوابك

3 - نفس السؤال في حالة $C = 2.10^{-8} mol / \ell$ و $C' = 1,0 mol / \ell$

تمرين 4

لتكون المجموعة الكيميائية التالية ، المحصلة بمزج :


- $C_1 = 0,15 mol / \ell$ من محلول يحتوي على أيونات الفورميات $(aq) HCOO^-$ تركيزه $V_1 = 15,0 ml$

- $C_2 = 0,20 mol / \ell$ من محلول حمض النتروز HNO_2 تركيزه $V_2 = 15,0 ml$

- $C_3 = 0,10 mol / \ell$ من محلول حمض الفورميك $HCOOH$ تركيزه $V_3 = 10,0 ml$

- $C_4 = 0,10 mol / \ell$ من محلول يحتوي على أيونات النيتريت $(aq) NO_2^-$ تركيزها $V_4 = 10,0 ml$

نعتبر معادلة التفاعل حمض - قاعدة التالية :



1 - حدد التراكيز البدئية للأنواع المتواجدة في الخليط قبل بداية التطور .

2 - أعط تعبير الحرفي لخارج التفاعل . أحسب قيمته :

2 - في الحالة البدئية

2 - أثناء التطور عندما يصبح $[HCOO^-] = 0,020 mol / \ell$

2 - في أي منحى تتطور المجموعة ؟

تمرين 5

يستعمل حمض الكلوريدريك في المسابح لضبط ال pH ، أما تحت كلوريت الصوديوم فهو يستعمل كمظهر .


تتم باستمرار مراقبة pH ماء المسبيح بواسطة مجس ويتم ضبطه أوتوماتيكيا بضم المنتوج المصحح ، بحيث يبقى pH في مستوى العادي (7,2-7,6) .

1 – خلال مراقبة ال pH قاس المجرس القيمة $pH = 8,5$ ، تؤدي هذه القيمة إلى التهاب العين .

عين في هذه الحالة النوع المهيمن بالنسبة للمزدوجة $HClO / ClO^-$.

2 – أحسب الخارج $\frac{[ClO^-]_i}{[HClO]_i}$ لحظة هذه المراقبة .

3 – لإرجاع pH إلى قيمته العادية تم ضخ 0,10mol من حمض الكلوريدريك في ماء المسبيح . معادلة التفاعل الحاصل هي :



أحسب ثابتة التوازن المقرونة بهذا التفاعل .

4 – الحالة البدئية للمجموعة هي كالتالي :

– حجم ماء المسبيح $V = 1,0 \cdot 10^5 \ell$ ،

– يحتوي ماء المسبيح على 0,10mol من أيونات الأوكسونيوم H_3O^+

– الخارج $\frac{[ClO^-]_i}{[HClO]_i}$ هو الذي تم حسابه في السؤال - 2 -

4 – أحسب خارج التفاعل في الحالة البدئية

4 – 2 – حدد منحى تطور المجموعة بتطبيق معيار التطور التلقائي .

4 – 3 – بين أن pH ماء المسبيح يتناقض .